

PROFILASSI ENDOCARDITE BATTERICA

Patologie ad alto rischio (prevenzione obbligatoria):

- **Pregressa endocardite**
- **Protesi valvolari**
- **Cardiopatie congenite cianogene non corrette o entro 6 mesi da correzione, o difetti residui.**
- **Valvulopatie nei soggetti cardiotrapiantati**

Patologie a basso rischio (prevenzione non indicata):

- **Prolasso mitralico**
- **Valvulopatie**
- **Cardiomiopatia ipertrofica**
- **Bicuspidia aortica**

Procedure ed interventi a rischio.

- **odontoiatriche (diagnostiche e terapeutiche; a rischio di batteriemia)**
- **app. respiratorio (diagnostiche e terapeutiche; a rischio di batteriemia)**
- **app. gastrointestinale**
- **app. genitourinario.**

Regime di profilassi

- **Assunzione orale: Amoxicillina 2 g (1-2 ore prima)**
- **Assunzione parenterale: Ampicillina (2 g) o Cefazolina o Ceftriaxone (1 g im/ev)**
- **Allergia a penicillina per os: Clindamicina (600 mg) o Azitromicina o Claritromicina (500 mg) o Cefalexina (2g)**
- **Allergia a penicillina parenterale: Cefazolina o Ceftriaxone (1g im/ev) o Clindamicina (600 mg im/ev).**

Fonte: L.G. AHA 2007, ACC/AHA VHD 2008.