

Nome: _____

Data di nascita: _____

Caro Collega,

Il paziente in oggetto è affetto da Sindrome di Brugada sulla base dell'evidenza clinica e/o molecolare. Pertanto è opportuno che il paziente eviti l'assunzione dei seguenti farmaci:

FARMACI DA EVITARE ASSOLUTAMENTE:

Antiarritmici*: Ajmalina, Allapinina, Ethacizina, Flecainide, Procainamide, Propafenone

Psicotropi: Amitriptilina, Clomipramina, Desipramina, Litio, Loxapina, Nortriptilina, Oxcarbazepina, Trifluoperazina

Anestetici / Analgesici*: Bupivacaina, Procaina, Propofol

Altre sostanze: Acetilcolina, eccessiva assunzione di alcool, Canapa, Cocaina, Ergonovina

* Per consigli per favore visiti il sito <http://www.brugadadrugs.org/emergencies>

FARMACI DA EVITARE SE POSSIBILE:

Antiarritmici: Amiodarone, Cibenzolina, Disopyramide, Lidocaina*, Propranololo, Verapamil, Vernakalant

Psicotropi: Bupropione, Carbamazepina, Ciamemazina, Clotiapina, Dosulepina, Doxepina, Fluoxetine, Fluvoxamina, Imipramina, Lamotrigina, Maprotilina, Paroxetina, Perfenazina, Fenitoina, Tioridazina

Anestetici / Analgesici: Ketamine, Tramadol

Altre sostanze: Demenidrinato, Difenilidramina, Edrofonio, Indapamida, Metoclopramida, Terfenadina/Fexofenadina

ALTRE NOTE:

* La lidocaina impiegata per anestesia locale (ad esempio per impiego odontoiatrico) sembra non essere pericolosa se la quantità somministrata è bassa e se è associata ad adrenalina (epinefrina) e pertanto esercita solo una azione locale.

Inoltre si raccomanda in caso di febbre, di eseguire un monitoraggio elettrocardiografico abbinato ad una adeguata terapia antipiretica.

Si presti particolare attenzione a controllare il farmaci presenti in prescrizioni multiple (associazioni farmacologiche).

Si rammenta che l'assenza di un farmaco in questa lista non esclude la possibilità di effetti collaterali proaritmici anche gravi.

Per una versione aggiornata dell'elenco per favore visiti il sito <http://www.brugadadrugs.org>

Cordiali Saluti,
